

Fitodenta hidrogelis su metronidazoliu *Klinikinio panaudojimo protokolas odontologams*

Šis dokumentas skirtas odontologams kaip praktinės gairės Fitodenta hidrogelio su metronidazoliu naudojimui įvairiose klinikinėse situacijose burnos chirurgijoje, periodontologijoje ir implantologijoje.

1. Po danties šalinimo (alveolės apsauga ir alveolito profilaktika)

- Rekomenduojama pilnai užpildyti alveolę Fitodenta hidrogeliu.
- Sudėtyje esanti hialurono rūgštis skatina angiogenezę ir audinių regeneraciją.
- Metronidazolis veikia prieš anaerobinę mikroflorą ir padeda mažinti poekstrakcinio alveolito riziką.

2. Dantenų uždegimas, periodonto kišenės, periimplantitis

- Hidrogelis aplikatoriumi švelniai įvedamas tiesiai į periodonto ar periimplantinę kišenę.
- Preparatas gerai išsilaiko aplikacijos vietoje ir palaipsniui išskiria veikliąsias medžiagas.
- Veikliosios medžiagos (hialurono rūgštis ir metronidazolis) veikia lokaliai kelias dienas.
- Gali būti taikomas kaip savarankiška priemonė arba kaip papildoma priemonė kartu su konservatyviu ar chirurginiu gydymu.

3. Chirurginio gydymo metu esant uždegiminiams židiniams

- Indikacijos: periapikaliniai židiniai, cistos, epuliai ir kiti uždegiminiai procesai.
- Po pataloginių audinių pašalinimo hidrogelis aplikatoriumi įvedamas į susidariusią ertmę.
- Preparatas išlieka vietoje ir veikia lokaliai kelias dienas.

4. Pooperacinės komplikacijos

- Taikoma po implantacijos, kaulo augmentacijos ar esant alveolitui.
- Hidrogelis aplikatoriumi švelniai įvedamas į pažeistą sritį.
- Preparatas padeda kontroliuoti mikrobinę kolonizaciją ir palaiko palankią terpę gijimui.

Pastaba: Preparatas skirtas profesionaliam naudojimui odontologijos praktikoje.