

Fitodenta hidrogels ar metronidazolu un hialuronskābi

Klīniskās lietošanas protokols zobārstiem

Šis dokuments paredzēts zobārstiem kā praktiski norādījumi par Fitodenta hidrogela ar metronidazolu un hialuronskābi lietošanu dažādās klīniskās situācijās mutes ķirurģijā, periodontoloģijā un implantoloģijā.

1. Pēc zoba ekstrakcijas (alveolas aizsardzība un alveolīta profilakse)

- Ieteicams pilnībā aizpildīt ekstrakcijas alveolu ar Fitodenta hidrogelu.
- Formulā esošā hialuronskābe veicina angiogēnēzi un audu reģenerāciju.
- Metronidazols darbojas pret anaerobo mikrofloru un var palīdzēt mazināt alveolīta (sausās alveolas) risku pēc ekstrakcijas.

2. Smaganu iekaisums, periodonta kabatas un periimplantīts

- Hidrogels ar aplikatoru maigi tiek ievadīts tieši periodonta vai periimplanta kabatā.
- Formula labi noturas lietošanas vietā un pakāpeniski atbrīvo aktīvās sastāvdaļas.
- Aktīvās sastāvdaļas (hialuronskābe un metronidazols) nodrošina lokālu iedarbību vairāku dienu garumā.
- To var izmantot kā patstāvīgu papildterapiju vai kombinācijā ar konservatīvu vai ķirurģisku ārstēšanu.

3. Ķirurģiskas iekaisīgu bojājumu ārstēšanas laikā

- Indikācijas ietver periapikālus bojājumus, cistas, epulīdu un citus iekaisīgus stāvokļus.
- Pēc patoloģisko audu izņemšanas hidrogels ar aplikatoru tiek ievadīts izveidojušajā dobumā.
- Formula paliek vietā un nodrošina lokālu iedarbību vairākas dienas.

4. Pēcoperācijas komplikācijas

- Var izmantot pēc implanta ievietošanas, kaula augmentācijas procedūrām vai alveolīta gadījumos.
- Hidrogels ar aplikatoru maigi tiek ievadīts skartajā zonā.
- Formula palīdz kontrolēt mikrobu kolonizāciju un veicina labvēlīgu vidi dziļšanai.

Piezīme

Šis produkts paredzēts tikai profesionālai lietošanai zobārstniecības praksē.